

ENSTIM (323)

- Étudiez le comportement au voisinage de $\pm\infty$ de $f : x \mapsto \frac{x^3}{x^2+1}e^{1/x}$.

ENSAM (292)

- Soient a et b deux réels. Justifiez l'existence de

$$f : x \in \mathbb{R} \mapsto \int_0^x (\ln(t^2 + t + 1) + a \ln(t^2 + 2t + 3) + b \ln(t^2 + t + 4)) dt$$

Déterminez a et b pour que f possède une limite quand x tend vers $+\infty$.

Un exercice autour de la fonction « partie entière »

- Q1** Rédigez une fonction `f` qui calcule $f(x)$ pour x donné.
- Q2** Tracez la courbe représentative de la restriction de f à l'intervalle $[-1, 1]$. Consultez au besoin l'aide sur `plot`, et ajoutez quelques éléments décoratifs.
- Q3** Quel est le sens de variation de f ? Quelle relation existe-t-il entre $f(x+1)$ et $f(x)$? Quelle est la valeur de $f(x)$ lorsque $x \in \mathbb{Z}$?
- Q4** Montrez qu'il existe un relatif k tel que les solutions éventuelles de l'équation $f(x) = 12345$ soient toutes dans l'intervalle $[k, k+1]$. Déterminez rapidement ce relatif (avec l'aide de Maple).
- Q5** Tracez la courbe représentative de la restriction de f à l'intervalle $[k, k+2]$. Consultez l'aide sur `plot` pour faire apparaître la droite d'équation $y = 12345$, puis utilisez les « poignées » pour agrandir la figure.
- Q6** Quel est le plus petit réel x tel que $f(x) > f(k)$? Quelles valeurs de $f(x)$ suffit-il de calculer pour résoudre l'équation proposée?
- Q7** Rédigez un script Maple qui calcule ces valeurs et concluez. Indication : consultez l'aide sur `seq`.
- Q8** Il serait commode de ne pas avoir à consulter cette liste fastidieuse ; écoutez les explications sur les listes et la fonction `select`, puis rédigez une fonction qui, à $q \in \mathbb{Z}$, associe une description de l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = q$. Il vous appartient de donner un sens au mot « description ».

Un exercice

- Pour $n \geq 1$, notons $S_n = \sum_{1 \leq k \leq n} \frac{1}{k^2}$. Nous admettons que la suite de terme général S_n converge vers $\ell = \pi^2/6$.
- Constatez que `sum` ne sait pas donner d'expression simple de S_n ; mais que, si l'on donne une valeur numérique à la place de n , on obtient un résultat numérique.
- Calculez S_n pour diverses valeurs de n (par exemple : 10, 100, 1000). Donnez une représentation graphique des résultats obtenus ; pour ce faire, commencez par construire une liste de la forme suivante :
`L := [[10, 1.635], [100, 1.640], [300, 1.641]]` ;
 où, dans chaque couple, la première composante est n et la deuxième est S_n . Ensuite, utilisez :
`plot(L, style=point)`
 Constatez la convergence de la suite.
- Utilisez `evalf` pour obtenir l'erreur $e_n = \ell - S_n$. Selon vous, e_n est-elle de l'ordre de $1/n^2$ ou $1/n$? Indication : encadrez $1/k^2$ par $1/k/(k+1)$ et $1/k/(k-1)$. La convergence est-elle rapide? Connaissez-vous une suite qui converge vers 0 beaucoup plus vite que (e_n) ? Et une suite qui converge vers 0 beaucoup plus lentement?
- Utilisez `time` pour estimer le temps de calcul de S_n ; celui-ci est-il proportionnel à n ? Donnez une représentation graphique des résultats obtenus.
- Maintenant, fixez la valeur de n et faites varier la valeur de `Digits` : le temps de calcul de S_n est-il proportionnel à `Digits` ou à son carré? Donnez une représentation graphique des résultats obtenus.