

**Exercice 1**

► Nous nous intéressons à la courbe  $\Gamma$  dont une représentation paramétrique est  $x(t) = \frac{t^2}{t-1}$ ,  $y(t) = \frac{t}{t^2-1}$ .

- Q1 Étudiez les branches infinies de  $\Gamma$  ; en particulier, vous ferez apparaître une asymptote oblique  $\mathcal{D}$  dont vous préciserez la place par rapport à  $\Gamma$ .
- Q2 Explicitez  $x'(t)$  et  $y'(t)$ , en déduire le tableau des variations de  $x$  et  $y$ . La courbe possède-t-elle des points stationnaires ?
- Q3 Déterminez le paramètre, puis les coordonnées du point d'intersection A de  $\mathcal{D}$  et  $\Gamma$ .
- Q4 Déterminez les coordonnées du point double B en résolvant le système 
$$\begin{cases} x(t) = x(u) \\ y(t) = y(u) \\ t \neq u \end{cases}$$
- Q5 Que pouvez-vous dire des tangentes à  $\Gamma$  en ce point B ?
- Q6 Explicitez  $x''(t)$  et  $y''(t)$ , puis factorisez  $\gamma(t) = x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)$ .
- Q7 Montrez que l'équation  $\gamma(t) = 0$  possède une (et une seule) racine réelle, que nous noterons  $\alpha$ .
- Q8 Donnez un encadrement raisonnable de  $\alpha$ , puis estimez les coordonnées du point C de  $\Gamma$  de paramètre  $\alpha$ . Que pouvez-vous dire du point C ?
- Q9 Quelle est l'interprétation géométrique du signe de  $\gamma(t)$  ?
- Q10 Construisez une représentation graphique de  $\Gamma$  ; vous ferez apparaître ses asymptotes ; l'unité sera égale à 2 cm.

**Exercice 2**

► Notons  $f : x \geq 1 \mapsto \int_1^x \sqrt{t \ln(t)} dt$ .

- Q1 Justifiez l'existence de la fonction  $f$ .
- Q2 Quelle est la classe de continuité de  $f$  ?
- Q3 Quelle est la classe de continuité de la restriction de  $f$  à l'intervalle  $]1, +\infty[$  ?
- Q4 Quel est le sens de variation de  $f$  ?
- Q5 Montrez que  $f$  réalise une bijection de  $[1, +\infty[$  sur un intervalle  $J$  que vous préciserez.
- Q6 Pour  $x \in J$ , justifiez l'inégalité  $f^{-1}(x) \geq \sqrt{2x+1}$ .
- Q7 Énoncez puis démontrez la formule d'intégration par parties.
- Q8 Au moyen d'une intégration par parties *soigneusement justifiée*, montrez que 
$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2x\sqrt{x \ln(x)}}{3}$$
- Q9 Donnez un équivalent *simple* de  $f(x)$  lorsque  $x$  tend vers 1 (par valeurs supérieures, bien entendu).