

- Les exercices de cette feuille portent sur les applications linéaires, en dimension quelconque.

Applications linéaires en dimension quelconque

Q1 Relations entre morphismes.

E est un \mathbb{K} -e.v. de dimension quelconque. G et H sont deux s.e.v. de E . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrez que $f(G + H) = f(G) + f(H)$. Votre démonstration utilise-t-elle la linéarité de f ?

- Soient $y \in f(G) + f(H)$; alors il existe $u \in G$ et $v \in H$ tels que $y = f(u) + f(v)$; comme f est linéaire, il vient $y = f(u + v) \in f(G + H)$. Donc $f(G + H) \subset f(G) + f(H)$.
- Inversement, soit $y \in f(G + H)$; alors $y = f(u + v)$ avec $u \in G$ et $v \in H$; donc $y = f(u + v) \in f(G) + f(H)$. Ainsi $f(G) + f(H) \subset f(G + H)$ et la preuve est terminée.

Q2 Autour d'un endomorphisme.

E est un \mathbb{K} -e.v. de dimension quelconque. g un endomorphisme de E vérifiant $g^3 = g^2 + g + \text{id}$. Montrez que g est bijectif et explicitez son automorphisme inverse.

- g commute avec tous ses itérés. Nous avons donc $\text{id} = g^3 - g^2 - g = g \circ (g^2 - g - \text{id}) = (g^2 - g - \text{id}) \circ g$. Ainsi, g est inversible, et son inverse est $g^{-1} = g^2 - g - \text{id}$.

Q3 ★★ Autour d'un endomorphisme (suite).

E est un \mathbb{K} -e.v. de dimension quelconque. f et g sont deux endomorphismes de E , qui vérifient $f^2 = 2f + f \circ g - \text{id}$. Comparez $f \circ g$ et $g \circ f$. *Indication* : écrivez d'une autre façon la condition de l'énoncé.

- Observons que $2f + f \circ g - f^2 = \text{id}$; f admet donc une inverse à droite dans $\mathcal{L}(E)$; par suite, $f \in GL(E)$. En composant à gauche par f^{-1} , il vient $f = 2\text{id} + g - f^{-1}$ soit $g = f + f^{-1} - 2\text{id}$: f commute avec f , f^{-1} et id , donc avec g . Ainsi, $f \circ g = g \circ f$.

Q4 E est un \mathbb{K} -e.v. de dimension quelconque. F , G et H sont trois \mathbb{K} -s.e.v. de E . $p \in \mathcal{L}(E, F)$ et $q \in \mathcal{L}(F, G)$. Prouvez les relations $\ker(p) \subset \ker(q \circ p)$ et $\text{im}(q \circ p) \subset \text{im}(q)$.

- $x \in \ker(p) \Rightarrow p(x) = \vec{0} \Rightarrow q(p(x)) = \vec{0} \Rightarrow (q \circ p)(x) = \vec{0} \Rightarrow x \in \ker(q \circ p)$.
- Si $y \in \text{im}(q \circ p)$, alors il existe $x \in E$ tel que $y = (q \circ p)(x) = q(p(x))$, donc $y \in \text{im}(q)$.

Q5 E est un \mathbb{K} -e.v. de dimension quelconque. f est un endomorphisme de E . G est un s.e.v. de E . Prouvez l'égalité $f^{-1}(f(G)) = G + \ker(f)$.

- $u \in f^{-1}(f(G))$ implique $f(u) \in f(G)$, donc il existe $v \in G$ tel que $f(u) = f(v)$, donc $f(u - v) = \vec{0}$, soit $u - v \in \ker(f)$. Donc $\boxed{u \in G + \ker(f)}$.
- $u \in G + \ker(f)$ implique l'existence de $v \in G$ et $w \in \ker(f)$ tels que $u = v + w$. Alors $f(u) = f(v + w) = f(v) + f(w) = f(v)$ car $w \in \ker(f)$. Mais $v \in G$, donc $f(v) \in f(G)$; comme $f(u) \in f(G)$, nous déduisons $\boxed{u \in f^{-1}(f(G))}$.

Q6 Définition d'un endomorphisme produit. E et F sont deux \mathbb{K} -e.v. de dimensions quelconques. $g \in \mathcal{L}(E, F)$. Prouvez que $\varphi : (x, y) \in E \times F \mapsto (x, y - g(x))$ est un endomorphisme de $E \times F$, muni de sa structure naturelle de \mathbb{K} -e.v. produit.

► Par définition, $\varphi(x, y) \in E \times F$.

► Soient x, x' dans E , y, y' dans F et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors :

$$\begin{aligned}\varphi((x, y) + \lambda(x', y')) &= \varphi(x + \lambda x', y + \lambda y') = (x + \lambda x', y + \lambda y' - g(x + \lambda x')) \\ &= (x + \lambda x', y + \lambda y' - g(x) - \lambda g(x')) = (x, y - \lambda g(x)) + (x', y' - \lambda g(x')) \\ &= \varphi(x, y) + \lambda \varphi(x', y')\end{aligned}$$

Ceci prouve la linéarité de φ .

► Montrons que φ est injective : $\varphi(x, y) = (\vec{0}, \vec{0}) \Rightarrow (x, y - g(x)) = (\vec{0}, \vec{0}) \Rightarrow x = \vec{0}$ et $y - g(x) = \vec{0}$; alors $y = g(x) = g(\vec{0}) = \vec{0}$. Ainsi $\varphi(x, y) = (\vec{0}, \vec{0})$. Finalement, $\boxed{\varphi \text{ est injective}}$.

► Montrons que φ est surjective : soit $(u, v) \in E \times F$. Déterminons $(x, y) \in E \times F$ tel que $\varphi(x, y) = (u, v)$, soit $(x, y - g(x)) = (u, v)$, ou encore $x = u$ et $y - g(x) = v$, ce qui revient à $y = v + g(x)$; ainsi, l'antécédent de (u, v) par φ est le couple $(u, v + g(u))$.

Q7 Autour de suites de réels.

E est l'espace vectoriel des suites de réels ; F est l'ensemble des suites convergentes vers 0 ; G est l'ensemble des suites constantes ; H est l'ensemble des suites convergentes. Montrez que H est un s.e.v. de E ; que F et G sont deux s.e.v. de H ; et que $F \oplus G = H$.

► F est non vide, et stable pour les deux opérations : c'est donc un s.e.v. de E ; si u appartient à F , alors u est convergente vers 0, donc appartient à H .

► De même, G est non vide, et stable pour les deux opérations : c'est donc un s.e.v. de E ; si u appartient à G , alors u est constante, donc appartient à H .

► Ainsi $F + G \subset H$; réciproquement, si $u \in H$, alors $u = v + w$ avec $v \in F$ et $w \in G$: donc $u \in F + G$.

► Par ailleurs, la somme $F + G$ est directe : en effet, si $u \in F \cap G$, alors, d'une part u converge vers 0, d'autre part la valeur de u est constante : donc u est la suite nulle. Ainsi $F \oplus G = H$.
