

Q1 E est un \mathbb{K} -e.v. de dimension finie n . f un endomorphisme de E . Comparez $\ker(f)$ et $\ker(f^2)$, puis $\operatorname{im}(f)$ et $\operatorname{im}(f^2)$. Dans chacun des cas, donnez un exemple où l'inclusion est stricte.

- ▶ $x \in \ker(f) \Rightarrow f(x) = 0 \Rightarrow f^2(x) = 0 \Rightarrow x \in \ker(f^2)$. Donc $\boxed{\ker(f) \subset \ker(f^2)}$.
- ▶ Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base canonique de E ; alors $\dim(\ker(f^k)) = n - k$ pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Donc $\dim(E) = \dim(\ker(f^0)) < \dim(\ker(f^1)) < \dots < \dim(\ker(f^{n-1})) < \dim(\ker(f^n)) = 0$. Cette suite d'inclusions est stricte.
- ▶ $y \in \operatorname{im}(f^2) \Rightarrow \exists x \in E : y = f^2(x) \Rightarrow \exists x \in E : y = f(f(x)) \Rightarrow y$ est l'image par f de $f(x) \in E \Rightarrow y \in \operatorname{im}(f)$. Donc $\boxed{\operatorname{im}(f^2) \subset \operatorname{im}(f)}$.
- ▶ La base canonique de \mathbb{K}^n est la même que précédemment, tout comme la condition sur f . Nous avons donc $\operatorname{rg}(f) = n - 1$, $\operatorname{rg}(f^2) = n - 2$ et ainsi de suite jusqu'à $\operatorname{rg}(f^{n-1}) = 1$; et enfin $\operatorname{rg}(f^n) = 0$. L'inclusion $\operatorname{im}(f^n) \subset \operatorname{im}(f^{n-1}) \subset \dots \subset \operatorname{im}(f) \subset \operatorname{im}(\operatorname{id}) = E$ est stricte. Au passage, nous constatons que f est nilpotente, et que son indice de nilpotence est n .

Q2 Sous les mêmes hypothèses, montrez l'équivalence des trois assertions :

$$\underbrace{\operatorname{im}(f) = \operatorname{im}(f^2)}_A \Leftrightarrow \underbrace{\ker(f) = \ker(f^2)}_B \Leftrightarrow \underbrace{E = \ker(f) \oplus \operatorname{im}(f)}_C$$

- ▶ Observons qu'il suffit de prouver successivement $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow C$ et $C \Rightarrow A$.
- ▶ $\boxed{A \Rightarrow B}$: nous avons $\ker(f) \subset \ker(f^2)$, il suffit de montrer que $\dim(\ker(f)) = \dim(\ker(f^2))$; le théorème du rang nous donne $\operatorname{rg}(f) = \dim(\operatorname{im}(f)) = \dim(\operatorname{im}(f^2)) = \operatorname{rg}(f^2)$. Par ailleurs, $\operatorname{rg}(f) + \dim(\ker(f)) = \dim(E)$ et $\operatorname{rg}(f^2) + \dim(\ker(f^2)) = \dim(E)$, donc $\dim(\ker(f)) = \dim(\ker(f^2))$ ce qui achève la preuve.
- ▶ $\boxed{B \Rightarrow C}$: cette fois, il suffit de montrer que $E = \ker(f) \oplus \operatorname{im}(f)$. La première égalité résulte du théorème du rang. Pour la deuxième : $y \in \ker(f) \cap \operatorname{im}(f) \Rightarrow \exists x \in E : y = f(x)$ et $f(x) = \vec{0} \Rightarrow f^2(x) = \vec{0} \Rightarrow x \in \ker(f^2) = \ker(f) \Rightarrow f(x) = \vec{0} \Rightarrow x = f(x) = \vec{0} \Rightarrow \ker(f) \cap \operatorname{im}(f) = \{0\}$
- ▶ $\boxed{C \Rightarrow A}$: comme $\operatorname{im}(f^2) \subset \operatorname{im}(f)$, il suffit d'établir $\operatorname{im}(f) \subset \operatorname{im}(f^2)$. Soit $y \in \operatorname{im}(f)$, montrons que $y \in \operatorname{im}(f^2)$. Il existe $x \in E$, tel que $y = f(x)$. Mais $\ker(f)$ et $\operatorname{im}(f)$ sont supplémentaires dans E : donc il existe $y \in \operatorname{im}(f)$ et $z \in \ker(f)$ tels qu'il existe $u \in E$ vérifiant $y = f(u)$ et $x = y + z = f(u) + z$; alors :

$$u = f(u) = f(f(u) + z) = f^2(u) + f(z) = f^2(u) \Rightarrow u \in \operatorname{im}(f^2) \Rightarrow \operatorname{im}(f) \subset \operatorname{im}(f^2)$$