

Énoncé

- Q1** • Soit P une fonction polynôme de degré n . Discutez le nombre de solutions réelles de l'équation $e^x = P(x)$.

Corrigé

- ▶ Remarquons que si $n = 0$, l'équation possède une solution si $x > 0$ et aucune si $x \leq 0$. Pour le cas $n = 1$, il est clair que le nombre de solutions peut être zéro (avec par exemple $x \mapsto x/2$), une (par exemple, si le coefficient dominant de P est négatif) ou deux (avec par exemple $x \mapsto 2x$). Remarquons également que la fonction \exp est sa propre dérivée, et que, si $n > 0$, alors la dérivée de P est une fonction polynôme de degré $n - 1$.
- ▶ Nous allons déjà montrer que le nombre de solutions de l'équation proposée est au plus $n + 1$, où n est le degré de P .
- ▶ Soit maintenant P de degré $n \geq 1$. Observons que toute solution ξ de l'équation $e^x = P(x)$ annule la fonction $g : x \mapsto e^x - P(x)$. Si cette fonction s'annule en au moins $k \geq 2$ points de \mathbb{R} , que nous noterons x_1, \dots, x_k avec $x_1 < x_2 < \dots < x_k$, alors le théorème de ROLLE affirme que la fonction $g' : x \mapsto e^x - P'(x)$ s'annule en au moins $k - 1$ points y_1, \dots, y_{k-1} avec $x_i < y_i < x_{i+1}$ pour $1 \leq i < k$.
- ▶ Notons alors $\mathcal{A}(n)$ l'assertion suivante :

si P est une fonction polynôme, alors l'équation $e^x = P(x)$ possède au plus $n + 1$ solutions réelles, où n est le degré de P .

$\mathcal{A}(0)$ est clair, d'après une remarque faite plus haut. Supposons $\mathcal{A}(n)$ acquise, et considérons une fonction polynôme de degré $n + 1$. De ce que nous venons de montrer, nous déduisons que l'équation $e^x = P(x)$ possède au plus $n + 2$ solutions : ceci établit $\mathcal{A}(n + 1)$. Par récurrence, $\mathcal{A}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- ▶ Supposons P de degré pair, et de coefficient dominant positif. Nous allons montrer que l'équation $e^x = P(x)$ possède au moins une solution. Pour ce faire, étudions le comportement de $g : x \mapsto e^x - P(x)$ lorsque x tend vers $\pm\infty$. Clairement, $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$; et, par raison de croissances comparées, $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$. Donc g change de signe ; comme elle est continue, elle s'annule au moins une fois.
- ▶ Si P est de degré pair, mais de coefficient dominant négatif, l'équation peut ne posséder aucune solution : un exemple simple est fourni par $P : x \mapsto -x^2$.
- ▶ Supposons P de degré impair, et de coefficient dominant négatif. Le même raisonnement s'applique : donc, dans ce cas encore, l'équation considérée possède au moins une solution.
- ▶ Si P est de degré impair, mais de coefficient dominant positif, l'équation peut ne posséder aucune solution : c'est le cas lorsque $P : x \mapsto kx$, avec $0 < k < 1$.