

Q1 Soient $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ et A sa matrice dans la base canonique de \mathbb{R}^3 . On suppose A antisymétrique ; montrez qu'il existe un et un seul vecteur $a \in E$ tel que $f(x) = a \wedge x$ pour tout $x \in E$. Nous dirons que a est *associé* à A . Soient A et B deux matrices carrées d'ordre 3, antisymétriques, et a, b leurs vecteurs associés. Vérifiez que $AB - BA$ est antisymétrique, et déterminez son vecteur associé.

Q2 Soit $a \in \mathbb{R}^3$. Étudiez l'endomorphisme f de \mathbb{R}^3 défini par $f(x) = a \wedge (a \wedge x)$. Source : TPE 1992.

Q3 u est un vecteur unitaire de \mathbb{R}^3 . Étudiez la fonction $f : x \mapsto x + (x \cdot u)u + \sqrt{3}(x \wedge u)$. Source : POX (RMS 1989.5.24)

Q4 Soient u, v et w trois vecteur de \mathbb{R}^3 . Établissez la *formule du double produit vectoriel* :

$$(u \wedge v) \wedge w = (u \cdot w)v - (v \cdot w)u$$

Vous pourrez proposer plusieurs méthodes.

Q5 Utilisez la formule du double produit vectoriel pour simplifier $(a \wedge b) \wedge (c \wedge d)$. Constatez que deux expressions sont possibles, et déduisez-en une preuve de l'affirmation suivante : « quatre vecteurs de \mathbb{R}^3 sont toujours liés ».

Q6 Soient a, b, c et d quatre vecteurs de \mathbb{R}^3 . Établissez la formule :

$$(a \wedge b) \cdot (c \wedge d) = \begin{vmatrix} a \cdot c & b \cdot c \\ a \cdot d & b \cdot d \end{vmatrix}$$

Q7 Soient A, B, C et D quatre points du plan ou de l'espace. Montrez la formule

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$$

Donnez une interprétation géométrique de cette relation, dans le cas du plan, puis dans le cas de l'espace.

Q8 Soient A, B, C et D quatre points de l'espace. Montrez la formule

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{BD}$$

Q9 Soient a, b et c trois vecteurs de \mathbb{R}^3 . Donnez des expression simples des quantités suivantes :

$$q_1 = m(a + b, b + c, c + a)$$

$$q_2 = m(a \wedge b, b \wedge c, c \wedge a)$$

$$q_3 = m((a + b) \wedge (a + c), (b + c) \wedge (b + a), (c + a) \wedge (c + b))$$

$$q_4 = m((a \wedge b) \wedge (a \wedge c), (b \wedge c) \wedge (b \wedge a), (c \wedge a) \wedge (c \wedge b))$$

$$q_5 = m((a \wedge b) + (a \wedge c), (b \wedge c) + (b \wedge a), (c \wedge a) + (c \wedge b))$$

Petit problème (Aleph TCE, Géométrie II, 6.14)

Q1 Soit f une rotation de \mathbb{R}^3 ; montrez que $f(u) \wedge f(v) = u \wedge v$ quels que soient u et v .

Q2 Que se passe-t-il si $f \in GO(\mathbb{R}^3) - SO(\mathbb{R}^3)$?

► Soit $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ distinct de $\mathbf{0}$ et vérifiant $g(u) \wedge g(v) = u \wedge v$ quels que soient u et v . Soit (i, j, k) une b.o.n.d. de \mathbb{R}^3

Q3 Que pouvez-vous dire de la famille $(g(i), g(j), g(k))$?

Q4 Conclusion concernant g ?